

ハチへの対処法

ハチに刺されないように

巣を刺激しない



ハチを刺激しない



家に入ってきたら



ハチに刺されたら

症状

大部分の人は刺されても、痛みや腫れなどの局所的な症状だけで終わります。
アシナガバチの場合：痛み 10分～1時間ぐらい
腫れ 1日ぐらい(痛痒い状態は数日続く)

手当て

- ①刺された所を水道水で流し、氷水で冷やす。
 - ②虫さされ(抗ヒスタミン軟膏)の薬をぬる。
 - ③病院に行く。
- 刺された所がとても腫れたり、刺された所以外も赤くなったり、全身に症状が出てきた時には、すぐに医師の治療を受けましょう。

スズメバチの場合

すぐ病院に行きましょう。

注意

アンモニアは効果ありません
ハチ毒はアンモニアでは無毒化されません。

ハチの巣は？

スズメバチの巣

駆除は家の所有者や会社、マンション等の管理者の責任です。
自分で行うのは危険ですので、業者へ依頼して下さい。

他のハチの巣

スズメバチ以外のハチは攻撃性が低いので、そのままそっとしておきましょう。
(アシナガバチは樹木の害虫をとってくれます)
但し、巣が物干し台などの身近にある場合は、駆除する必要があります。
駆除は下記の方法でご自分で行えます。
日野市環境保全課へご相談下さい。

*ご自分で巣を駆除する方法(アシナガバチの例)

- ①日没後、殺虫剤スプレーを巣に向けて噴霧する。
- ②翌朝、巣をたたき落とす(棒などで)。
巣やハチの死骸に直接手を触れないようにして片付ける。

*ご自分で巣の駆除が困難な場合

有料になりますが、害虫駆除業者に駆除を依頼してください。
電話帳の「消毒業」、「ハチ駆除」でお調べ下さい。

自然を大切に、循環型の社会をめざしましょう

日野市 環境保全課

日野市神明1-12-1 TEL.042(585)1111(代)